

ETUDE PARTUM : Critères d'Inclusion**UN des deux critères suivants :**

- Thrombophilie héréditaire telle que:
 - Facteur V Leiden hétérozygote
 - Mutation hétérozygote du gène de la Prothrombine
 - Déficit en Protéine C
 - Déficit en Protéine S
- Alitement ≥ 7 jours pendant la grossesse (activité significativement diminuée; se lever seulement pour la toilette)

**OU****DEUX des critères suivants :**

- IMC ≥ 30 kg/m² AVANT la grossesse
- Tabagisme ≥ 5 cigarettes/jour pendant les 12 derniers mois
- Antécédent de thrombose veineuse superficielle
- Pré-éclampsie (TA ≥ 140 mmHg et/ou ≥ 90 mmHg au moins une fois **ET** protéinurie)
- Mort fœtale in utéro (> 20 semaines) lors de la grossesse actuelle
- Accouchement actuel par césarienne non planifiée
- Poids de naissance < 3^{ème} percentile en tenant compte du sexe et de l'âge gestationnel

Sexe	INTERGROWTH International Chart: 3 ^{ème} Percentile pour le poids de naissance en fonction de l'âge gestationnel (grammes)																		
	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Masculin	440	510	580	660	750	840	950	1080	1210	1180	1450	1700	1930	2130	2320	2490	2630	2760	2880
Féminin	420	480	550	620	700	800	900	1020	1140	1200	1470	1710	1920	2110	2280	2420	2550	2650	2740

- Infection péri-partum ou postpartum (comprend la chorioamnionite)
 - Température $\geq 38.3^{\circ}\text{C}$ **ET** Augmentation des leucocytes ou des neutrophiles ou hémocultures positives
- Hémorragie > 1000 m pendant les 24 heures postpartum
 - Pertes sanguines **TOTALES** _____ mL

 Pas de facteur de risque antepartum

 Pas de facteur de risque postpartum

Patiente éligible? Demandez à la patiente si elle est intéressée à participer à l'étude :

 Oui

 Peut-être plus tard

 Non

 Étude non proposée

Si étude non proposée, pourquoi ?
